

# Matematika 2.

## DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

### Elementární metody řešení ODR prvního řádu

Petr Salač a Jiří Hozman  
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická  
Technická univerzita v Liberci  
[petr.salac@tul.cz](mailto:petr.salac@tul.cz)  
[jiri.hozman@tul.cz](mailto:jiri.hozman@tul.cz)

# Separovatelné ODR.

Diferenciální rovnici

$$y' = f(x) \cdot g(y) , \quad (1)$$

kde  $f$  a  $g$  jsou funkce jedné proměnné, nazýváme **separovatelnou ODR**.

## Řešení

1) Je-li  $g(y) \neq 0$  separujeme proměnné

$$\frac{1}{g(y)} y' = f(x)$$

2) integrujeme obě strany podle  $x$

$$\int \frac{1}{g(y)} y' dx = \int f(x) dx$$

↓

$$G(y) = F(x) + C$$

(implicitně definované řešení  $y = y(x)$ )

3) Je-li to možné, přejdeme k explicitnímu vyjádření  $y = H(x)$ .

# Separovatelné ODR.

## Příklad

$$y' = \frac{y + 1}{x}$$

## Příklad

Řešte Cauchyovu úlohu

$$y' = -\frac{x(y^2 - 1)}{y(x^2 - 1)} \quad y(2) = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

# Separovatelné ODR.

## b) Homogenní ODR.

Diferenciální rovnici, kterou lze přepsat do tvaru

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right), \quad (2)$$

kde  $f$  je spojitá funkce, nazýváme **homogenní ODR**.

## Řešení

Použitím substituce  $z = \frac{y}{x}$ , kde  $z$  je nová neznámá funkce proměnné  $x$ ,  $D_z = R \setminus \{0\}$ , převedeme homogenní ODR na separovatelnou ODR. Tu vyřešíme a z jejího řešení  $z = z(x)$ , pak spočítáme řešení  $y = y(x)$  původní ODR.

## Příklad

Řešte diferenciální rovnici

$$y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}.$$

# Lineární ODR 1. řádu.

Diferenciální rovnici, kterou lze přepsat do tvaru

$$y' + p(x)y = q(x) , \quad (3)$$

kde  $p, q$  jsou funkce spojité v intervalu  $(a,b)$ , nazýváme **lineární ODR 1. řádu**.  
Jestliže pro všechna  $x \in (a, b)$  platí  $q(x) = 0$ , nazýváme rovnici (6) **homogenní rovnicí** (někdy též rovnicí bez pravé strany), v opačném případě říkáme, že (6) je **nehomogenní rovnice** (někdy rovnice s pravou stranou).

(Termín „homogenní“ zde má zcela jiný význam než v bodě b))

Diferenciální rovnici (6) je přiřazena homogenní lineární ODR

$$y' + p(x)y = 0 . \quad (4)$$

# Lineární ODR 1. řádu.

## Řešení:

1) Separací proměnných nalezneme všechna řešení  $y_h$  homogenní lineární ODR (7) ve tvaru

$$y_h = C \cdot e^{-\int p(x) dx}, \quad x \in (a, b),$$

kde  $C \in \mathbb{R}$  libovolná konstanta.

2) Metodou variace konstanty nalezneme partikulární řešení  $y_p$  rovnice (6) (tj. libovolné konkrétní řešení (6) v intervalu  $(a, b)$ ).

Řešení  $y_p$  hledáme ve tvaru

$$y_p = k(x) \cdot e^{-\int p(x) dx}, \quad (5)$$

kde  $k$  je nějaká neznámá funkce.

Výraz (8) derivujeme a dosadíme do (6), čímž dostaneme

$$k'(x) = q(x) \cdot e^{\int p(x) dx},$$

integrací určíme

$$k(x) = \int q(x) \cdot e^{\int p(x) dx}, \quad x \in (a, b). \quad (6)$$

Dosazením (9) do (8) dostaneme partikulární řešení.

3) Sestavíme obecné řešení  $y_o = y_h + y_p$ .

# Lineární ODR 1. řádu.

**Příklad:**

Řešte diferenciální rovnici

$$y' - \frac{y}{2(x+1)} = e^x \sqrt{x+1}.$$

# Lineární ODR 1. řádu.

## Cauchyova úloha pro lineární ODR 1. řádu.

Hledáme řešení  $y$  rovnice

$$y' + p(x).y = q(x) \quad (7)$$

splňující počáteční podmínku

$$y(x_0) = y_0 .$$

## Věta 2.

Jestliže  $p$  a  $q$  jsou spojité funkce v intervalu  $(a, b)$ , potom má Cauchyova úloha pro lineární ODR 1. řádu právě jedno řešení pro každé  $x_0 \in (a, b)$ ,  $y_0 \in \mathbb{R}$ .

## Příklad.

Řešte Cauchyovu úlohu

$$y' - \frac{y}{2(x+1)} = e^x \sqrt{x+1} \quad y(0) = 0.$$